



Boletín Agroclimático del Caquetá

Edición Febero - Abril 2026

En este boletín encontrarás:

- Predicción climática y riesgos agroclimáticos

Condiciones de lluvias (precipitaciones) febrero, marzo y abril.



- Recomendaciones agropecuarias

Café, cacao, maíz, caucho, aves, plátano y banano, frutales amazónicos, meliponicultura, bufalina apicultura, bovinos, piscícola.



- Herramientas para monitorear el comportamiento del clima.

Lluvias, temperatura, alertas de incendios, deslizamientos, estado de ríos.



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Agricultura



GOBERNACIÓN DE
CAQUETA



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales



COMITÉ DEPARTAMENTAL
DE GANADEROS DEL CAQUETA



the
Amazon
Conservation
Team



FEDEGAN

¿Cómo se comportaron las lluvias en Enero?

En zonas puntuales de Solano



☞ **Llovió dentro de lo normal.**

En el resto del departamento

☞ **Llovió más de lo normal.**


Los municipios donde se registraron los mayores excesos fueron

☞ **Curillo, Albania, Belén de los Andaquíes y San José.**



¿Cómo es el comportamiento típico del clima en febrero, marzo y abril?


En febrero y marzo se presenta un aumento progresivo de las lluvias en todo el departamento.



Marzo es un mes de transición hacia la temporada lluviosa, por lo tanto, los acumulados pueden oscilar entre 200 y 400 mm.



En Abril se consolida la temporada de más lluvias y los acumulados mensuales pueden superar los 500 mm.



La temp. mínima se mantiene cerca de los 8 °C sobre el piedemonte, mientras que en el resto del departamento varia entre 15 °C y 25 °C.

La temp. máxima oscila entre 20 °C a 33 °C en las diferentes zonas del departamento.

¿Qué nos espera en febrero?

1

Se esperan incrementos de las lluvias sobre gran parte del departamento, principalmente sobre la parte alta de San Vicente, Puerto Rico y el Doncello.

2


Es probable que se registran **entre 8 y 16 días con lluvia en gran parte del departamento**; en San Vicente y Solano, típicamente se presentan entre 4 y 8 días con lluvia durante el mes.

3

Se estima que la temperatura máxima registre leves disminuciones en zonas puntuales de Solano, Cartagena del Chaira y San Vicente.

4

Realice zanjias superficiales y mantenga limpios los drenajes en corrales y zonas de ordeño para evitar encharcamientos.



¿Qué nos espera en marzo?

1

La predicción indica **exceso de lluvias** sobre los municipios de Florencia, El Doncello, Paujil, Cartagena, Solita, Valparaíso y zonas puntuales de Solano.

2


El número de días con lluvia prevé un **ligero aumento**, se presentarían **entre 14 y 24 días** con lluvia en el mes.

3

Las **temperaturas máxima y mínima** podría registrar aumentos entre 0,5 y 1,0 °C a lo largo del departamento.

4

Ante un posible aumento de las lluvias, se **recomienda trasladar el ganado a potreros más altos**, evitando el pastoreo en zonas con **acumulación de agua**.



¿Qué nos espera en abril?

1

Se estiman lluvias cercanas a lo normal y ligeramente por debajo de los promedios hacia los municipios de San Vicente, Cartagena del Chairá, Albania y Curillo.

2


Este mes presenta un **aumento en los acumulados de precipitación**; sin embargo, se estima una disminución en el número de días con lluvia, oscilando entre **10 y 20 eventos en el mes**.

3

Las **temperaturas máxima y mínima** podrían registrar **aumentos entre 0,5 y 1,0 °C**.

4

Se recomienda la aplicación de cal en zonas de descanso y de tránsito frecuente del ganado para disminuir humedad y desarrollo de microorganismos.




Fenómeno ENOS - El Niño-Oscilación del Sur

Recuerda que: **El ENOS** es un fenómeno climático que ocurre en el océano Pacífico y influye en las lluvias y temperaturas de nuestro país.

El Niño: Trae menos lluvias y más calor.

La Niña: Trae más lluvias y más días nublados.



Estado del fenómeno ENOS (Enero - Marzo)



- Existe un 89 % de probabilidad de que se mantenga una condición tipo La Niña.
- Esto significa que puede incrementar la intensidad y frecuencia de las lluvias durante febrero y marzo.
- Para el trimestre febrero-abril se estiman transición a condiciones normales.

¿Qué significa neutralidad?

- El clima se comporta cercano a lo normal para la época.
- Pueden presentarse días secos y lluviosos de forma variable.
- No se esperan extremos prolongados, pero sí cambios entre regiones.

Riesgos agroclimáticos

Se señalan los riesgos vigentes para el mes de febrero de 2026 para el departamento del Caquetá.




Sequía




Erosión



Altas temperaturas



Plagas y enfermedades



Vientos fuertes




Exceso de lluvias



Perdida de humedad en el suelo



Incremento de humedad en el suelo



Incendios forestales



Tormentas eléctricas



Leves lluvias



Inundaciones



¡Tome medidas de prevención para cultivos, animales y de autocuidado!



Herramientas para profundizar

A continuación encuentras una serie de herramientas virtuales que pueden ayudarte en la toma de decisiones. Para acceder da clic en el icono.

Visualizador de condiciones, pronósticos y alertas del IDEAM

Conozca aquí pronósticos de lluvias, alertas de incendios, deslizamientos, estado de los ríos.



Windy: mapa de pronósticos, temperaturas, vientos.

Conozca aquí pronósticos de lluvias, temperaturas, vientos - hora, día, semanal.



Pronósticos hidrológicos y alertas tempranas del IDEAM

Conozca aquí el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del país y las alertas hidrológicas.



Mapas de predicción climática del IDEAM

Conozca aquí las actualizaciones de la predicción climática a nivel departamental.



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Agricultura



GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales



COMITÉ DEPARTAMENTAL
DE GANADEROS DEL CAQUETÁ



the
Amazon
Conservation
Team



FEDEGAN


Recomendaciones para el cultivo de café

- Ajuste drenajes y limpie canales para evitar encharcamientos y asfixia radicular durante picos intensos de lluvia.
- Programe fertilización fraccionada, aplicando después de lluvias fuertes, para reducir pérdidas por lixiviación de nutrientes.
- Mantenga coberturas vivas o mulch para proteger suelo, mejorar infiltración y disminuir erosión en pendientes cafeteras.
- Revise sombrío regulando densidad de árboles, favoreciendo ventilación y menor incidencia de enfermedades fungosas.
- Intensifique monitoreo de roya y antracnosis; aplique controles oportunos según umbrales técnicos recomendados.
- Realice podas sanitarias eliminando ramas enfermas, mejorando aireación y reduciendo humedad persistente en el follaje.
- Fortalezca barreras vivas y terrazas para controlar escorrentía y conservar fertilidad del suelo.
- Planee resiembras en sitios con pérdidas por exceso hídrico, utilizando variedades adaptadas y certificadas.
- Evite labores mecanizadas con suelo saturado para prevenir compactación y daños estructurales permanentes.
- Asegure manejo adecuado de aguas mieles y residuos, evitando contaminación en periodos lluviosos prolongados.
- Programe cosecha selectiva frecuente para reducir sobremaduración y pérdidas por caída de frutos.
- Mantenga comunicación con asistencia técnica local y consulte boletines climáticos para decisiones oportunas.


Recomendaciones para el cultivo de cacao

- Limpie y mantenga drenajes funcionales para evitar encharcamientos que favorecen enfermedades radiculares y pérdida de plantas.
- Regule el sombrío podando árboles acompañantes, mejorando ventilación y reduciendo humedad excesiva en el dosel productivo.
- Refuerce monitoreo de moniliasis y escoba de bruja, aplicando controles integrados según recomendaciones técnicas locales.
- Realice podas sanitarias periódicas retirando mazorcas enfermas y material contaminado, disminuyendo fuentes activas de infección.
- Aplique fertilización fraccionada posterior a lluvias intensas, reduciendo lixiviación y mejorando eficiencia nutricional del cultivo.
- Mantenga cobertura vegetal o mulch para conservar humedad equilibrada y proteger suelo frente a erosión.
- Establezca barreras vivas en laderas para controlar escorrentía y preservar fertilidad durante precipitaciones frecuentes.
- Evite transitar maquinaria o animales con suelo saturado, previniendo compactación y daños estructurales permanentes.
- Programe cosechas frecuentes, evitando sobremaduración y pérdidas asociadas a pudriciones en periodos húmedos prolongados.
- Revise drenajes en viveros y áreas jóvenes, asegurando desarrollo radicular sano durante alta pluviosidad.
- Fortalezca sistemas agroforestales diversificados, mejorando resiliencia del cacao frente a variabilidad climática regional.

Recomendaciones para el cultivo de Caucho (Hevea brasiliensis)

- 
- Mantenga drenajes limpios y funcionales para evitar encharcamientos que afecten raíces y crecimiento del cultivo.
 - Realice plateo oportuno, facilitando infiltración uniforme y reduciendo competencia de malezas en periodos lluviosos.
 - Evite tránsito de maquinaria en suelos saturados, previniendo compactación y daños estructurales permanentes.
 - Ajuste fertilización en aplicaciones fraccionadas, disminuyendo pérdidas por lixiviación durante lluvias frecuentes e intensas.
 - Monitoree enfermedades foliares y de corteza, aplicando controles preventivos bajo orientación técnica especializada.
 - Regule densidad de cobertura vegetal, favoreciendo ventilación y menor humedad persistente en plantaciones jóvenes.
 - Programe sangría considerando condiciones de humedad, evitando daños en corteza durante lluvias intensas.
 - Fortalezca barreras vivas en laderas, reduciendo escorrentía y protegiendo fertilidad del suelo.
 - Supervise viveros y replantes, asegurando buen drenaje y desarrollo radicular saludable.
 - Implemente manejo integrado de malezas, evitando competencia excesiva en condiciones favorables de crecimiento.


Recomendaciones para el cultivo de plátano

- 
- Revisar y limpiar drenajes antes de abril, considerando que la climatología indica excedentes hídricos prolongados que pueden intensificarse con el aumento de lluvias, generando riesgo de encharcamiento.
 - Mantener cobertura vegetal o mulch en el suelo, lo que ayuda a conservar humedad en los meses relativamente menos lluviosos y reduce erosión y compactación durante periodos de alta precipitación.
 - Realizar control de arvenses en el primer trimestre, cuando las condiciones de humedad permiten un manejo más eficiente y menor daño al suelo.
 - Incrementar el monitoreo de enfermedades foliares (sigatoka amarilla y negra) a partir de marzo, ya que el aumento de humedad y temperatura favorece su desarrollo.
 - Ejecutar deshojes sanitarios de manera oportuna, especialmente antes y durante el periodo lluvioso, para mejorar la aireación del cultivo y reducir la presión de enfermedades.
 - Evitar labores pesadas y tránsito frecuente en el lote durante abril-junio, cuando los suelos tienden a saturarse según la climatología normal.
 - Asegurar un adecuado manejo de densidad y deshije, evitando exceso de plantas que incrementen la humedad interna y el riesgo fitosanitario.
 - Proteger las plantas jóvenes del estrés térmico, utilizando coberturas vivas o sombrío temporal, considerando las temperaturas ligeramente superiores a lo normal previstas.


Recomendaciones para el cultivo de Hortalizas (cilantro, tomate, ají, pepino)

- Establezca camas elevadas para mejorar drenaje y prevenir encharcamientos prolongados que afectan raíces sensibles.
- Limpie y mantenga zanjias de desagüe, facilitando evacuación oportuna de aguas lluvias intensas.
- Instale coberturas plásticas o túneles bajos, reduciendo impacto directo de lluvias fuertes sobre cultivos.
- Programe siembras escalonadas, disminuyendo riesgos de pérdidas totales ante eventos climáticos extremos.
- Aplique fertilización fraccionada posterior a lluvias intensas, evitando lixiviación excesiva de nutrientes.
- Refuerce monitoreo de enfermedades fungosas favorecidas por alta humedad y temperaturas cálidas regionales.
- Realice deshoje sanitario y podas ligeras, mejorando ventilación y reduciendo humedad foliar persistente.
- Evite tránsito con suelos saturados, previniendo compactación y afectaciones estructurales permanentes.
- Mantenga coberturas orgánicas, protegiendo suelo contra erosión y salpicadura de patógenos.
- Instale sistemas de tutorado firme para cultivos altos, reduciendo volcamiento por lluvias frecuentes.

Frutales Tropicales/amazónicos

- 
- Mantenga drenajes limpios y funcionales, evitando encharcamientos prolongados que afectan raíces y productividad del cultivo.
 - Establezca coberturas vegetales vivas para proteger suelo, mejorar infiltración y reducir erosión en pendientes.
 - Realice podas de formación y sanitarias, favoreciendo ventilación y disminuyendo humedad excesiva en el dosel.
 - Intensifique monitoreo fitosanitario, especialmente hongos favorecidos por alta humedad y lluvias frecuentes.
 - Aplique fertilización fraccionada después de lluvias intensas, reduciendo pérdidas por lixiviación de nutrientes.
 - Evite labores mecanizadas con suelos saturados, previniendo compactación y deterioro estructural permanente.
 - Fortalezca barreras vivas y zanjas de infiltración para controlar escorrentía en terrenos inclinados.
 - Revise tutorado y soporte de plantas jóvenes, previniendo volcamiento por suelos húmedos y vientos.
 - Programe cosechas oportunas, evitando sobremaduración y pérdidas por pudriciones asociadas a humedad elevada.
 - Maneje arvenses de manera integrada, reduciendo competencia excesiva durante condiciones

Recomendaciones meliponicultura

- 
- A close-up photograph of a honeybee on a yellow flower. The bee is positioned in the upper half of the frame, facing right, with its head and thorax visible. It has a brown and black striped body and translucent wings. The flower has bright yellow, tubular petals. The background is a soft, out-of-focus green. Overlaid on the image is a list of seven beekeeping tips in Spanish, each preceded by a blue square icon. The text is in a black, sans-serif font. The tips are: 1. Mantener buena ventilación sin corrientes fuertes. 2. Sellar las cajas para evitar filtraciones. 3. Las abejas bien ajustadas y techos impermeables. 4. Cerrar las aberturas durante periodos muy lluviosos. 5. Evitar la manipulación excesiva en días lluviosos. 6. Mantener colonias fuertes y con buena población. 7. Proporcionar alimentación energética (jarabe de azúcar diluida). 8. Buscar fuentes de polen si hay escasez.
- er buena ventilación sin corrientes fuertes.
- sellos de cajas para evitar filtraciones.
- pas bien ajustadas y techos impermeables.
- r aperturas durante periodos muy lluviosos.
- manipulación excesiva en días lluviosos.
- er colonias fuertes y con buena población.
- strar alimentación energética (jarabe de azúcar diluida).
- r fuentes de polen si hay escasez.

Recomendaciones de bovinos y bufalinas

Acciones:

- Implementar o fortalecer sistemas de pastoreo rotacional, incrementando los periodos de descanso de los potreros para permitir la recuperación de la pastura.
- Restringir el acceso del ganado a los potreros con mayor saturación y priorizar aquellos con mejor drenaje natural o mayor cobertura vegetal.
- Habilitar áreas de descanso elevadas o con mejor firmeza, donde los animales puedan permanecer temporalmente sin deteriorar la pradera.
- Suministrar sales mineralizadas completas de manera permanente.
- Implementar bloques multinutricionales o suplementos energéticos.
- Realizar desparasitaciones estratégicas según diagnóstico local, fortalecer el control de garrapatas y revisar periódicamente las pezuñas para detectar lesiones tempranas.





Recomendaciones para el manejo de aves

- Elevar pisos de galpones (cama sobre base seca) en zonas con suelos saturados.
- Revisar techos, canales y bajantes para evitar filtraciones.
- Implementar cortinas laterales regulables para controlar entrada de lluvia y viento.
- Incrementar frecuencia de volteo de cama (cada 2–3 días en periodos lluviosos).
- Usar materiales absorbentes: cascarilla de arroz seca o viruta.
- Aplicar cal agrícola o secantes en puntos húmedos.
- Instalar extractores o ventilación mecánica en galpones cerrados.
- Proveer calefacción suplementaria en pollitos cuando bajen temperaturas nocturnas.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Mantener programa de vacunación actualizado.




Recomendaciones para el manejo de porcinos

- Implementar áreas de acceso con grava o material seco.
- Separar zonas de estiércol y evitar acumulación de lodos.
- Mantener corrales secos, especialmente en maternidad y destete.
- En lechones: calefacción suplementaria y áreas secas.
- Imacendar concentrado en lugares secos y elevados.
- Revisar calidad de agua (turbidez por lluvias).
- Limpiar bebederos diariamente.
- Ajustar raciones si baja el consumo por clima húmedo.





Recomendaciones piscicultura

- 
- ción en días muy lluviosos o turbios.
- de el nivel antes de lluvias intensas.
- oras evitando picos de lluvias intensas.



¿Qué son las Mesas Técnicas Agroclimáticas?



- Son espacios de **encuentro y diálogo** entre instituciones, técnicos y comunidades rurales.



- **Analizan** la información del clima y su impacto en la agricultura.




- Funcionan a nivel departamental y Nacional.



- Se basan en información sobre los modelos climáticos, IDEAM, monitoreo climáticos, etc.

¿Para qué sirven las Mesas Técnicas Agroclimáticas?

- 
- A person wearing a green shirt is holding a smartphone, looking at the screen. The background is a solid green color with a faint image of a plant. The text is overlaid on the right side of the image.
- Traducen la información del clima en recomendaciones prácticas.
 - Apoyan la toma de decisiones en el campo.
 - Ayudan a reducir riesgos por sequías, lluvias intensas o heladas.
 - Fortalecen la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.

Contacto

Agradecemos el apoyo de las instituciones que hacen parte de la MTA del Caquetá. Le invitamos a unirse a nuestro grupo en WhatsApp para mantenerse actualizado sobre fechas y lugares de realización de las sesiones mensuales. Escaneé o presione el código qr para acceder al grupo de la MTA.



Marta Liliana Márquez Torres
martha.marquez@minagricultura.gov.co

Gisell Gómez
Gisellegomezlaveriano@gmail.com

Camilo Zapata Mora
camilo.zapatamora@fao.org

María Paula Ramírez
Maria.RamirezSanchez@fao.org

Omar González Cely
omar.gonzalezcely@fao.org

Jorge Leonardo Rizzo Nieto
jorge.rizzonieto@fao.org

Daimer Fernando Losada Bermeo
daimer.losadabermeo@fao.org

Javier Betacur Vivas
javier.betancurvivas@fao.org



Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura



Agricultura



Instituto de Hidrología,
Meteorología y
Estudios Ambientales



COMITÉ DEPARTAMENTAL
DE GANADEROS DEL CAQUETA



FEDEGAN